

店頭効果を大切にする

メロン栽培農家の必需品!!

# 穫れたてをカタチに!!

# ニチノール®

食品添加物製剤


成分：酢酸ビニル樹脂  
含有量：47.0%

処理



つるが活きる!!  
この一塗りが決め手です。

無処理



収穫7日後のメロンの状態

## 特長

- 収穫した果実のリュース(つる)の切り口に塗るだけでリュースの萎凋防止に役立ち、商品価値を上げます。
- 果実に傷がついた場合も、同様に塗ることで黒かびの予防になります。

## 適用作物と使用方法

作物名	使用目的	使用方法
メロン等	リュースの萎凋防止	リュースの切り口を整理した後、切り口に均一に塗布し、乾燥させる。
	黒かびの予防	

## 試験成績 (静岡県温室農業協同組合)

※酢酸ビニル樹脂処理

### 萎凋防止

供試果 No.	5月15日収穫処理(7日後調査)			
	処理区		無処理区	
	先端	元	先端	元
1	±	±	++	+++
2	±	-	++	+++
3	±	-	++	+++
4	+	±	+++	+++
5	-	-	+++	+++

(凡例)

- : 収穫時と殆ど変わらない。
- ±: わずかにしおれている。
- +: 少し先き縮む。
- ++: かなりしおれている、少し黄変。
- +++ : すじの様子にしおれ、黄変もある。

### 黒かびの発生に及ぼす影響

試験区	供試果					
	1		2		3	
	先端	元	先端	元	先端	元
処理区	-	-	-	-	-	-
無処理区	+++	+++	++	+++	++	+++

(凡例)

- +: つるの先の変化。
- +++ : 果梗つけ根近くまでふはしたものの。

## 効果薬害等の注意

- 収穫したメロンのつる、果菜類へのたの切り口塗布、表皮の皮膜用以外には使用しない。
- 使用時は換気の良い場所で行い、適切な保護具を着用する。着火源となる付近では取扱いをしない。
- 使用後は密栓して冷暗所に食品類と区別して保管する。小児の手の届くところには置かない。火気に近づけない。
- 皮ふ、衣服、自動車等に付着しないようにする。付着したら直ちによく洗う。
- 誤飲に注意。誤飲の際は直ちに医師の手当てを受ける。

販売元



株式会社 二チノ一緑化

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14番4号  
TEL 03(3808)2281(代) FAX 03(3808)2360  
http://www.nichino-ryokka.co.jp

取扱店