



農林水産省登録  
第20043号

芝生用薬剤

殺菌剤

芝生用殺菌剤

# クラポスト®

フロアブル



ラージパッチ・ブラウンパッチと  
フェアリーリング病の  
予防と治療に!!



## 特長

- ① 浸透移行性があり、予防にも治療にも安定した高い効果を発揮します
- ② 使いやすいフロアブル剤です
- ③ リゾクトニア菌や担子菌類など幅広い病害に効果があります

®登録商標



株式会社 二チノ一緑化

芝用殺菌剤  
**グラポスト**  
フロアブル

**成分・性状**

種類名：フルトラニル水和剤  
有効成分：フルトラニル……………30%  
性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

**安全性**

〔毒性区分〕 普通物*	急性経口毒性 (LD <sub>50</sub> )	急性経皮毒性 (LD <sub>50</sub> )
	ラット♂♀ >5000mg/kg マウス♂♀ >5000mg/kg	ラット♂♀ >2000mg/kg

\*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

〔魚毒性〕 B類相当	コイ	オオミジンコ
	LC <sub>50</sub> (48hr) 53.3mg/L LC <sub>50</sub> (96hr) 13.5mg/L	LC <sub>50</sub> (3hr) >1000mg/L EC <sub>50</sub> (24hr) >1000mg/L

**適用病害と使用方法**

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用時期	使用方法 m <sup>2</sup> 当りの散布水量	本剤の 使用回数	フルトラニル を含む農薬の 総使用回数
芝	日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	発病初期	500ml	4回以内	8回以内
		フェアリーリング病		5ℓ		
				1000		
	ベント グラス	葉腐病 (ブラウンパッチ)		500ml		
		フェアリーリング病		5ℓ		
				1000		

**効果・薬害等の注意**

- 使用前に容器を軽く振ってください。
- 蚕に対して毒性があるので、桑にはかからないように注意して散布してください。
- 散布する場合は、散布液の飛散によって自動車の塗装等に被害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

**安全使用上の注意**

- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 魚毒性:水産動植物(魚類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 保管:直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。



葉腐病 (ラージパッチ)



葉腐病 (ブラウンパッチ)



フェアリーリング病



フェアリーリング病

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず、廃棄物処理業者に委託する等により適切に処理してください。

取扱店

**株式会社 二チノ一緑化**  
green technology

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 岡谷ビルディング6F  
TEL (03) 3808-2281 FAX (03) 3808-2360  
大阪営業所 TEL (072) 727-8015  
ホームページアドレス <http://www.nichino-ryokka.co.jp>