



農林水産省登録
第22269号

芝生用薬剤

殺虫剤

芝生用殺虫剤

ステインガー®

フロアブル

降雨の影響が小さい!

長い残効性で
チョウ目害虫を
シャットアウト!!

特長

- 1 チョウ目害虫に優れた効果を発揮するベンゼンジカルボキサミド系統の殺虫剤です
- 2 速やかに摂食行動を阻害し、高い食害抑制効果を示します
- 3 優れた効果持続性があり、長期間にわたって安定した効果を示します
- 4 幼虫の発育令にかかわらず高い効果を示します
- 5 薬剤が乾いた後の降雨の影響は小さく、十分な効果が期待できます

®登録商標



株式会社 二チノ一緑化

芝生用殺虫剤 スティンガー® フロアブル

成分・性状

種類名：フルベンジアミド水和剤
有効成分：フルベンジアミド……………42%
性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性

〔毒性区分〕 普通物*	急性経口毒性(LD ₅₀)	急性経皮毒性(LD ₅₀)
	ラット♀ >2,000mg/kg	ラット♂♀ >2,000mg/kg

*毒劇物に該当しないものを指している通称

〔魚毒性〕	コイ	オオミジンコ
	LC ₅₀ (96hr) >1,000mg/L	EC ₅₀ (48hr) 0.0105mg/L

規格 100ml×8本

適用害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	希釈水量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルベンジアミドを含む農薬の総使用回数
芝	スジキリヨトウ	0.035ml/㎡	50~200ml/㎡	発生初期	2回以内	散布	2回以内
	シバツガ タマナヤガ	0.05ml/㎡	50~500ml/㎡				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルベンジアミドを含む農薬の総使用回数
樹木類	ケムシ類	8000倍	発生初期	2回以内	散布	2回以内

効果・薬害等の注意

- 使用前によく容器を振ってください。
- 蚕に対しては長期間毒性があるので、桑葉には絶対かからないように散布してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。




安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。
- 眼に入った場合は直ちに水洗してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

耐雨性(茶葉での室内試験)

散布後、数時間経過した条件(薬剤が乾いた後の降雨)では比較的薬液の流しやすいう茶葉のような硬い葉でも、降雨による影響がないことが確認されています。したがって、散布液が乾いた後の降雨であれば、十分な効果が期待できます。



試験年：平成8年
供試虫：チャハマキ4令
方法：供試作物(コルベン挿し)の葉上から薬剤(特製リノール0.03%添加)を処理し、処理当日、および処理1日後に、人工降雨装置を用いて40mm/hrの降雨に1時間暴露した。風乾後、処理葉を切り取り、シャーレに入れ供試虫を接種し、5日後に生死を調査した。1区5-10頭2連制。
日本農業株式会社 総合研究所試験

残効性

ゴルフ場のフェアウェイ・ラフはもちろん、タマナヤガやシバツガなど複数種の害虫が発生するペントグリーンにも長期間安定した効果が確認されています。

薬剤名	対象害虫	8/27 (処理日)	9/8 (12日後)	9/16 (20日後)	10/18 (52日後)
スティンガーフロアブル区 4000倍 0.2L/㎡	タマナヤガ	-	-	-	-
	シバツガ	-	-	-	-
スティンガーフロアブル区 10000倍 0.5L/㎡	タマナヤガ	-	-	-	+
	シバツガ	-	-	-	-
慣行防除区 対照剤E 4000倍 0.3L/㎡	タマナヤガ	-	+	+++	-
	シバツガ	-	-	+	-

※9/16の害虫発生後に追加散布
食害痕または被害度：-(なし) ~ +++(基大)、PG：バッティンググリーン
試験場所：神奈川県Aゴルフ場 サブグリーンおよびバッティンググリーン(草種：ペントグラス、品種：CY-2)
処理日：平成20年8月27日(発生前) 但し、慣行防除区は9月16日以降に再散布
対象害虫：タマナヤガ、シバツガ
調査方法：各グリーンにおける食害痕および被害度を遠観で確認
試験機関：東日本グリーン研究所

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず、廃棄物処理業者に委託する等により適切に処理してください。
- 飲めません。

取扱店

株式会社 二チノ一緑化

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 岡谷ビルディング6F
TEL (03) 3808-2281 FAX (03) 3808-2360
大阪営業所 TEL (072) 727-8015
ホームページアドレス <http://www.nichino-ryokka.co.jp>