



農林水産省登録
第22295号

芝生用薬剤

除草剤

芝生用除草剤

日農 **クサレス**®

顆粒水和剤



信頼の
効果と実績!

特長



① 優れた除草効果

芝生の主要雑草であるヒメシバ、スズメノカタビラ等、一年生イネ科雑草に対し優れた除草効果を発揮します。

② 長い抑草期間

120日程度の効果の持続性が確認されています。

③ 芝生に対する安全性

完成した日本芝（コウライシバ、ノシバ）に対し薬害もなく安全です。

®はUnited Phosphorus Limitedの登録商標



株式会社 二チノ一緑化

芝生用除草剤

目 **ワサレス**

顆粒水和剤

安全性

〔毒性区分〕 普通物	急性経口毒性 (LD ₅₀)	急性経皮毒性 (LD ₅₀)
	ラット♂♀ >4640mg/kg	ウサギ♂♀ >4640mg/kg
〔魚毒性〕	コイ	
	TLm (48hr) 12~32mg/L (ナプロパミド原体)	

効果・薬害等の注意

- 本剤は生育の進んだ雑草に効果が劣るので、雑草の発生前に散布してください。
- 洋芝に使用すると薬害を生じる恐れがあるので、使用しないでください。
- 周辺の作物、草花、樹木に薬液がかからないよう注意して散布してください。
- 使用後の散布器具は十分に水洗してください。
- 公園等で使用する場合、特に以下のことに注意してください。
 - 激しい降雨の予想される場合は使用を避けてください。
 - 散布薬液の飛散、あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生じることはないよう十分に注意して散布してください。
 - 水源池等に本剤が飛散・流入しないように十分に注意してください。
 - 散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域の諸物件に十分留意してください。
- 散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けて下さい。
- 残効性があるので、後作物栽培までの期間が短い場合には、後作物に影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。特にいね科作物、うり科作物、ほうれんそう、さといも、にんじん等を後作に作ることはさけてください。

- 薬剤が気化するおそれがあるので、ハウス等の施設内及びその周辺では使用しないでください。
- 所要量を所定量の水に加え、十分かき混ぜてから(噴霧器等で)土壌全面に均一に散布してください。調製した散布液はその日のうちになるべく早く使用してください。

安全使用上の注意

- 眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣等を着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして洗眼してください。
- 公園等で使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中及び散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせないでください。小児、人畜等に留意してください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
- 保管:密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

- 使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空ボトルは圃場などに放置せず、廃棄物処理業者に委託する等により適切に処理してください。

取扱店



株式会社 二チノ一緑化

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 岡谷ビルディング6F
TEL (03) 3808-2281 FAX (03) 3808-2360
大阪営業所 TEL (072) 727-8015
ホームページアドレス <http://www.nichino-ryokka.co.jp>