


フロアブルになって  
使いやすく  
なりました!

# グラフティ<sup>®</sup> フロアブル

## 残効性に優れる土壌処理型除草剤



道 路



公園・堤とう等



鉄 道

### ① 幅広い殺草スペクトラム

一年生イネ科雑草や各種の一年生広葉雑草に対して高い効果を示します。特にキク科雑草に卓効を示します。

### ② 長い残効性

120日～180日程度の効果持続期間があります。

### ③ 安定した除草効果

土壌吸着性が高いため、安定した処理層を形成します。

### ④ 周辺樹木への影響が小さい

薬剤散布土壌周辺の樹木への薬害リスクが低い製品です。植栽地付近では茎葉へのドリフト(飛散)に注意してご使用ください。

グラフティ<sup>®</sup>は日本曹達株式会社の登録商標です。



■ 成分・性状

● 種類名：フルボキサム水和剤      ● 有効成分：フルボキサム……42.0%      ● 性状：淡青緑色水和性粘稠懸濁液体

■ 包装規格：900ml×4本

■ 安全性(製剤)

人畜に対する安全性 普通物※ ※毒劇物に相当しないものを指している通称

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 急性経口毒性(LD <sub>50</sub> ) | ラット 雌♀：> 5,000mg/kg |
| 急性経皮毒性(LD <sub>50</sub> ) | ラット 雌♀：> 2,000mg/kg |
| 皮膚刺激性                     | ウサギ 刺激性なし           |
| 眼刺激性                      | ウサギ 弱い刺激性あり         |
| 皮膚感作性                     | 陰 性                 |

環境に対する安全性

|      |                                     |    |
|------|-------------------------------------|----|
| コイ   | LC <sub>50</sub> (96hr)：2.3mg/L     | ※1 |
| ミジンコ | EC <sub>50</sub> (48hr)：3.9mg/L     | ※1 |
| 藻類   | ErC <sub>50</sub> (72hr)：> 54.2mg/L | ※1 |

※1：原体での試験データ

■ 適用雑草と使用方法


| 作物名 | 適用場所                     | 適用雑草名 | 使用時期  | 使用量            |               | 本剤の使用回数 | 使用方法                 | フルボキサムを含む農薬の総使用回数 |
|-----|--------------------------|-------|-------|----------------|---------------|---------|----------------------|-------------------|
|     |                          |       |       | 薬量             | 希釈水量          |         |                      |                   |
| 樹木等 | 公園、堤とう、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | 一年生雑草 | 雑草発生前 | 250～500ml /10a | 100～200ℓ /10a | 2回以内    | 植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布 | 2回以内              |

■ 殺草スペクトラム(発芽前土壌処理) グラフティフロアブル 0.25ml/㎡

| 雑草    |          | 効果 | 雑草  |           | 効果 | 雑草    |           | 効果 |
|-------|----------|----|-----|-----------|----|-------|-----------|----|
| イネ科   | メシバ      | ●  | キク科 | オオアレチノギク  | ●  | マメ科   | シロツメクサ    | ●  |
|       | スズメノカタビラ | ●  |     | ハルジオン     | ●  |       | コメツブツメクサ  | ●  |
|       | オヒシバ     | ●  |     | ヒメジオン     | ●  |       | ヤハズソウ     | ◎  |
|       | エノコログサ   | ◎  |     | ノボロギク     | ●  | ナデシコ科 | カラスノエンドウ  | ◎  |
|       | スズメノテッポウ | ●  |     | セイヨウタンポポ  | ●  |       | ツメクサ      | ●  |
|       | スズメノヒエ   | □  |     | ノゲシ       | ◎  |       | ハコベ       | ●  |
| アブラナ科 | タネツケバナ   | ●  |     | ウラジロチチコグサ | ●  |       | オランダミミナグサ | ●  |
| シソ科   | ヒメオドリコソウ | ●  |     | ヒメムカシヨモギ  | ●  |       |           |    |

効果：●極大(100%)、◎極大(99～95%)、○大(94～90%)、□中(89～80%)、△小(79～60%)、×無(59%～) 日本曹達(株)小田原研究所

■ グラフティフロアブルの土壌移行性



⚠ 効果・薬害などの注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木類等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所等では使用しないでください。また、樹木類等有用植物の根が分布していると思われるところでは使用をさけてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

- 食べられません。 ● 使用前にラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ● 使用後の空ボトルは園場などに放置せず、廃棄物処理業者に委託する等により適切に処理してください。

取扱店

販売元



NICHINO

株式会社ニチノ緑化

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 岡谷ビルディング6F  
TEL (03) 3808-2281 FAX (03) 3808-2360  
東京営業所 TEL (03) 3808-2283  
大阪営業所 TEL (072) 727-8015  
ホームページアドレス <https://www.nichino-ryokka.co.jp>

製造元



日本曹達株式会社

本社 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号