

芝生用除草剤

アップデート®

「アップデート」は、アグロ カネショウ (株) の登録商標

ヒメクグ・ハマスゲに

広葉雑草に加え、ヒメクグ・ハマスゲを防除します

安定して

有効成分が茎葉や根から素早く吸収されるため、
刈り込みなどの影響を受けにくい薬剤です

長く

有効成分が根や塊茎に蓄積され、長期間効果が持続します



規格：1ℓ×10本
剤型：液剤



アグロ カネショウ株式会社



試験事例

アグロ カネショウ(株)自社試験（2021）

《 ヒメクグに対する効果 》


場 所：茨城県常陸大宮市

処 理 日：6月9日

調 査 日：7月5日（処理 26 日後）

薬量・水量：アップデート 0.5mℓ/ 水 250 mℓ / m²

供試作物：コウライシバ



適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	イマザキンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
日本芝	一年生雑草	芝生育期 （雑草生育期）	200～400 mℓ/10a	250ℓ /10a	3回以内	雑草 茎葉散布	3回以内
	ヒメクグ						
	ハマスゲ	春夏期芝生育期 （雑草生育期）	300～500 mℓ/10a				

令和4年12月現在

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前によく振り混ぜてください。
- 本剤の所定量を所要量の水ですすめ、よくかきまぜてから散布してください。散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 本剤散布により日本芝に一時的に葉色の淡緑化、または生育抑制が見られることがあるので注意してください。
- 本剤の殺草効果は遅効的で、一般に効果発現までに1週間～10日を要するので、誤ってまき直しなどないように注意してください。
- タープを形成した日本芝に使用し、ベントグラスなどの寒地型西洋芝では薬害が生じるのでかからないようにしてください。特にゴルフ場においては、西洋芝のグリーンやティーグラウンド及びその周辺では散布をひかえてください。
- 激しい降雨の予想される場合は使用をさけてください。
- 散布薬液の飛散あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生じることのないよう十分注意して散布してください。特に樹木周辺での使用はさけてください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠ 安全使用上の注意

〈農薬使用者に係る注意〉

- 誤飲などのないよう注意してください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意してください。

保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく冷涼な所。

AK23A01(アップデート)